

RISPÉRIDONE

RISPERDAL®

INDICATIONS



France

- Schizophrénie
- Trouble bipolaire
 - Épisodes maniaques
- Maladie d'Alzheimer
 - Agressivité persistante
- Handicap intellectuel
 - Trouble des conduites (âge > 5 ans)



États-Unis

- Schizophrénie (âge > 13 ans)
- Trouble bipolaire
 - Épisodes maniaques (âge > 10 ans)
 - Prévention des récidives
- Autres troubles psychotiques
- Trouble du spectre de l'autisme
 - Irritabilité



Non officielles

- Trouble bipolaire
 - Épisode dépressif majeur
- Troubles anxieux sévères
- Trouble obsessionnel compulsif
- Troubles du comportement
- Trouble du contrôle des impulsions

EFFETS SECONDAIRES FRÉQUENTS



Prise de poids +++

Hyperglycémie, diabète

Augmentation des taux de triglycérides et cholestérol



Sédation +++

Fatigue

Somnolence

Symptômes extrapyramidaux

Tremblements, rigidité et contractures musculaires

Akathisie

Impatiences, sensations d'inconfort, de tension intérieure

Hyperprolactinémie

Troubles sexuels, du cycle menstruel, écoulement mammaire

Constipation

Bouche sèche

Troubles de l'accommodation visuelle

Hypotension orthostatique

Vertiges ou sensation de malaise en se levant

Tachycardie

À SAVOIR

- La rispéridone provoque davantage d'effets secondaires extrapyramidaux (tremblements, rigidité et contractures musculaires) que la plupart des autres antipsychotiques de seconde génération.
- La rispéridone augmente davantage le taux de prolactine que la plupart des autres antipsychotiques de seconde génération. Ceci peut devenir problématique en cas de désir de grossesse, de ménopause et/ou de risque d'ostéoporose.
- La fatigue et la somnolence peuvent devenir problématiques en journée, notamment en dehors des états de crise, lorsque la rispéridone est utilisée pour prévenir les rechutes.