

ARIPIPRAZOLE

ABILITY®

INDICATIONS



France

- **Schizophrénie** (âge > 15 ans)
- **Trouble bipolaire**
 - Épisodes maniaques (âge > 13 ans)
 - Prévention des récidives maniaques



États-Unis

- **Schizophrénie** (âge > 13 ans)
- **Trouble bipolaire**
 - Épisodes maniaques
 - Épisodes mixtes
 - Prévention des récidives
- **Épisode dépressif majeur**
 - En association à un antidépresseur
- **Trouble du spectre de l'autisme**
 - Irritabilité



Non officielles

- Trouble bipolaire
 - Épisode dépressif majeur
- Autres troubles psychotiques
- Trouble obsessionnel compulsif
- Troubles du comportement
 - Dans la démence
 - Chez l'enfant et l'adolescent
- Trouble du contrôle des impulsions

EFFETS SECONDAIRES FRÉQUENTS

Akathisie ++

Impatiences, sensations d'inconfort, de tension intérieure
Anxiété

Insomnie +

Difficultés d'endormissement, de maintien du sommeil
Réveil précoce

Sédation

Fatigue
Somnolence

Symptômes extrapyramidaux

Tremblements, rigidité et contractures
musculaires

Nausées

Vomissements
Constipation

Prise de poids

Hyperglycémie, diabète

Augmentation des taux de triglycérides et cholestérol

Hypotension orthostatique

Vertiges ou sensation de malaise en se levant

Tachycardie

À SAVOIR

- L'aripiprazole est une molécule peu voire non sédatrice, ce qui la rend peu avantageuse (seule) dans les troubles qui s'accompagnent d'insomnie et d'anxiété mais avantageuse dans la plupart des autres cas.
- L'aripiprazole ne favorise pas ou que peu la prise de poids (ainsi que le diabète et l'augmentation des taux de triglycérides et de cholestérol), ce qui constitue un avantage par rapport à la plupart des autres antipsychotiques.
- Les propriétés de l'aripiprazole lui permettent de contrer les actions d'autres antipsychotiques, notamment certains effets secondaires (ex. hyperprolactinémie ou symptômes extrapyramidaux) lorsqu'il y est associé à faibles doses.