

# OLANZAPINE

ZYPREXA®

## INDICATIONS



France

- Schizophrénie
- Trouble bipolaire
  - Épisodes maniaques
  - Prévention des récidives si réponse à l'olanzapine au cours d'un épisode maniaque



États-Unis

- Schizophrénie (âge > 13 ans)
- Trouble bipolaire
  - Épisodes maniaques (âge > 13 ans)
  - Épisodes dépressifs (avec fluoxétine, âge > 10 ans)
  - Prévention des récidives
- Épisode dépressif majeur
  - En cas de résistance
  - Associé à la fluoxétine



Non officielles

- Autres troubles psychotiques
- Troubles du comportement
  - Dans la démence
  - Chez l'enfant et l'adolescent
- Trouble du contrôle des impulsions
- Personnalité borderline

## EFFETS SECONDAIRES FRÉQUENTS



### Prise de poids +++

Hyperglycémie, diabète

Augmentation des taux de triglycérides et cholestérol

### Sédation zzz +++

Fatigue

Somnolence

Constipation

Bouche sèche

Troubles de l'accommodation visuelle

Hypotension orthostatique

Vertiges ou sensation de malaise en se levant

Tachycardie

### Symptômes extrapyramidaux

Tremblements, rigidité et contractures musculaires

### Akathisie

Impatiences, sensations d'inconfort, de tension intérieure

### Hyperprolactinémie

Troubles sexuels, du cycle menstruel, écoulement mammaire

## À SAVOIR

- L'olanzapine favorise davantage la prise de poids (ainsi que le diabète et l'augmentation des taux de triglycérides et de cholestérol) que la plupart des autres antipsychotiques.
- L'olanzapine peut devenir moins efficace chez les personnes qui débutent ou augmentent leur consommation de cigarettes et les effets secondaires peuvent augmenter chez les personnes qui diminuent ou interrompent leur consommation.
- Certaines données suggèrent une plus grande efficacité de l'olanzapine comparée à celle de la plupart des autres antipsychotiques, ce qui pourrait expliquer son utilisation fréquente en cas de symptômes résistants.