

CLOZAPINE

LEPONEX®

INDICATIONS



France

- **Schizophrénie**
 - Résistance au traitement
 - Association à la maladie de Parkinson



États-Unis

- **Schizophrénie**
 - Résistance au traitement
 - Réduction du risque suicidaire



Non officielles

- Trouble bipolaire
 - Résistance au traitement
- Troubles neuro et/ou psychotiques
 - Résistance au traitement

EFFETS SECONDAIRES FRÉQUENTS



Prise de poids ++++

Hyperglycémie, diabète
Augmentation des taux de triglycérides et cholestérol

Sédation +++++

Fatigue
Somnolence

Constipation

Bouche sèche ou hypersialorrhée

Troubles de l'accommodation visuelle

Hypotension orthostatique

Vertiges ou sensation de malaise en se levant

Tachycardie

Myocardite



Neutropénie

Surveillance obligatoire du taux de globules blancs

À SAVOIR

- L'efficacité de la clozapine est supérieure à celle des autres antipsychotiques dans la schizophrénie mais elle n'est indiquée qu'en seconde intention en raison du risque de neutropénie.
- La clozapine est associée à une diminution du risque suicidaire dans la schizophrénie.
- La clozapine est plus sédative que la plupart des autres molécules antipsychotiques, la fatigue et la somnolence qui en découlent peuvent devenir problématiques durant la journée.
- La clozapine provoque beaucoup moins d'effets secondaires extrapyramidaux (tremblements, rigidité et contractures musculaires) que la plupart des autres antipsychotiques.