

QUÉTIAPINE

XEROQUEL®

INDICATIONS



France

- **Schizophrénie**
- **Trouble bipolaire**
 - Épisodes maniaques
 - Épisodes dépressifs majeurs
 - Prévention des récurrences
- **Épisode dépressif majeur**
 - En cas de réponse insuffisante à un antidépresseur
 - En association à un antidépresseur



États-Unis

- **Schizophrénie** (âge > 13 ans)
- **Trouble bipolaire** (âge > 10 ans)
 - Épisodes maniaques
 - Épisodes dépressifs majeurs
 - Prévention des récurrences
- **Épisode dépressif majeur**
 - En cas de réponse insuffisante à un antidépresseur
 - En association à un antidépresseur



Non officielles

- Insomnie
- Troubles anxieux sévères
 - Trouble anxieux généralisé
 - Trouble de stress post-traumatique
- Autres troubles psychotiques
- Troubles du comportement
 - Dans la démence
 - Dans la maladie de Parkinson
- Trouble du contrôle des impulsions

EFFETS SECONDAIRES FRÉQUENTS



Prise de poids +++

Hyperglycémie, diabète
Augmentation des taux de triglycérides et cholestérol



Sédation ++++

Fatigue
Somnolence

Constipation
Bouche sèche
Troubles de l'accommodation visuelle

Hypotension orthostatique
Vertiges ou sensation de malaise en se levant
Tachycardie

À SAVOIR

- La quétiapine provoque beaucoup moins d'effets secondaires extrapyramidaux (tremblements, rigidité et contractures musculaires) que la plupart des autres antipsychotiques.
- La quétiapine est une molécule sédatrice, ce qui la rend plutôt avantageuse dans les périodes de crises ou les troubles qui s'accompagnent d'insomnie et d'anxiété.
- La fatigue et la somnolence peuvent cependant devenir problématiques en journée, notamment en dehors des états de crise, lorsque la quétiapine est utilisée pour prévenir les rechutes.