

PROFIL		MOLÉCULES		FORMES			EFFETS SECONDAIRES						
		DCI	Spécialité	BUV	INJ	LP	↗poids	sédation	extrapyram	↗prolact	antichol	HypoTA	↗QTc
ANTIPSYCHOTIQUES NEUROLEPTIQUES ATYPIQUES DE SECONDE GÉNÉRATION	Profil classique à doses élevées	Aripiprazole	ABILIFY®	+	+	+	+ / ++	+ / ++	++	+	+ / ++	+	+ / ++
		Clozapine	LEPONEX®	–	–	–	+++++	+++++	+	+	+++++	+++++	++
		Olanzapine	ZYPREXA®	–	+	+	+++++	+++	++	++	+++	++	++
		Quétiapine	XEROQUEL®	–	–	–	+++	+++++	+ / ++	+	+++	+++	+++
		Risperidone	RISPERDAL®	+	–	+	++	++	+++	+++++	++	++	++
		Amisulpride	SOLIAN®	+	+	–	+ / ++	+ / ++	++	+++++	++	+ / ++	+++
		Sulpiride	DOGMATIL®	+	–	–	+++	++	++	+++	+ / ++	+ / ++	++
		Tiapride	TIAPRIDAL®	+	+	–	++	++	++	+++	++	+ / ++	+++
		Loxapine	LOXAPAC®	+	+	–	++	+++	+++	+++	+++	+++	+ / ++
		Cyamémazine	TERCIAN®	+	+	–	+++	+++	++	++	+++++	+++	++
NEUROLEPTIQUES CLASSIQUES DE PREMIÈRE GÉNÉRATION	Profil atypique à faibles doses	Chlorpromazine	LARGACTIL®	+	+	–	+++	+++	+++	++	+++++	+++++	+++
		Lévomépromazine	NOZINAN®	+	+	–	++	+++++	++	++	+++	+++	+++
		Flupentixol	FLUANXOL®	+	+	+	+++	++	+++++	+++	++	++	++
		Zuclopenthixol	CLOPIXOL®	+	+	+	+++	+++	+++	+++++	++	++	++
		Halopéridol	HALDOL®	+	+	+	+ / ++	++	+++++	+++++	++	++	+++
		Pimozide	ORAP®	–	–	–	+ / ++	++	+++++	++	+++	++	+++++
		Penfluridol	SEMAP®	–	–	+	++	++	+++	+++	+++	++	+++