

Décanoate d'halopéridol
HALDOL DÉCANOAS®
Solution huileuse

Palmitate de palipéridone
XEPLION®
Solution huileuse

Aripiprazole
ABILIFY MAINTENA®
Solution aqueuse

STABILISATION PRÉALABLE SOUS

Halopéridol (HALDOL®) oral

Diviser la dose par deux chaque semaine après la première injection

Rispéridone (RISPERDAL®) oral

Arrêt brutal ou progressif après la première injection

Aripiprazole (ABILIFY®) oral

Arrêt brutal si 2 premières injections (+ 20 mg oral à J1)

DOSES DE TRANSITION

1 injection (glutéal)

J1 = 10 à 15 fois la dose orale quotidienne
(1 ampoule = 50 mg d'halopéridol)

2 injections (deltoïde)

J1 = 150 mg
J8 = 100 mg

(deltoïde ou glutéal)

1 injection

J1 = 400 mg

2 injections

J1 = 400 mg + 400 mg
(2 sites différents)

DOSES D'ENTRETIEN ET AJUSTEMENT

Entre 1 et 6 ampoules par mois (glutéal)

Dose ajustable par paliers mensuels d'une ampoule

Fréquence ajustable selon réponse sans dépasser 6 ampoules par injection et par mois

Entre 25 et 150 mg par mois (deltoïde ou glutéal)

Dose ajustable mensuellement avec effet très retardé

Fréquence non ajustable mais marge tolérable de +/- 1 semaine

400 mg par mois (deltoïde ou glutéal)

Dose ajustable à 300 mg voire à 200 mg en cas d'effets secondaires

Fréquence non ajustable mais marge tolérable de +/- 4 jours

Décanoate de zuclopenthixol

CLOPIXOL AP®

Solution huileuse

Pamoate d'olanzapine

ZYPADHERA®

Solution huileuse

STABILISATION PRÉALABLE SOUS

Zuclopenthixol (CLOPIXOL®) oral

Réduire graduellement sur une semaine
après la première injection

Olanzapine (ZYPREXA®) oral

Arrêt brutal
après la première injection

DOSES DE TRANSITION

1 injection (glutéal)

J1 = 5 à 8 fois la dose orale quotidienne
(1 ampoule = 200 mg de clopixol)

Dose orale préalable

10 mg/j

Toutes les 2 semaines
pendant 2 mois (glutéal)

210 mg

Toutes les 4 semaines
pendant 2 mois

405 mg

15 ou 20 mg/j

300 mg

Non

DOSES D'ENTRETIEN ET AJUSTEMENT

**Entre 1 et 2 ampoules toutes les 2 à 4 semaines
(glutéal)**

Intervalle ajustable selon réponse (< 2 semaines si nécessaire)

Dose orale préalable

10 mg/j

Toutes les 2 semaines
(glutéal)

150 mg

Toutes les 4 semaines
(glutéal)

300 mg

Dose ajustable selon réponse (> 2 ampoules si nécessaire mais sans
dépasser 2 ampoules par fesse)

15 mg/j

210 mg

405 mg

20 mg/j

300 mg

Non